



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी - ४३१ ४०२
ईमेल - gkmsparbhani@gmail.com



परभणी जिल्हा कृषि हवामान सल्ला पत्रक क्रमांक - ३८/२०१७

शुक्रवार दिनांक - ११.०८.२०१७

मागील आठवड्यातील हवामानस्थिती (दिनांक ०५ ते ११ ऑगस्ट २०१७)		हवामान अंदाज (दिनांक १२ ते १६ ऑगस्ट २०१७)					
हवामान घटक		दिनांक	१२/०८	१३/०८	१४/०८	१५/०८	१६/०८
पाऊस (मिमी) मागील आठवड्यातील	१२.७	पाऊस (मिमी)	००.०	००.०	०३.०	०६.०	०७.०
पाऊस (मिमी) १/१/२०१७ पासून आजपर्यंत	३८८.४	कमाल तापमान (अं.से.)	३३.०	३२.०	३३.०	३३.०	३२.०
पाऊस (मिमी) १/६/२०१७ पासून आजपर्यंत	३८८.४		किमान तापमान (अं.से.)	२३.०	२३.०	२३.०	२३.०
किमान तापमान (अं.से.)	२१.७ - २४.५	ढग स्थिती (आकाश)	पूर्णता: ढगाळ				
ढग स्थिती (आकाश)	अंशतः ढगाळ ते ढगाळ	सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%)	७५	७७	७४	८४	८६
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%)	७२ - ९०	दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%)	५४	५२	५०	५१	६५
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%)	५३ - ७७	वा-याचा वेग (किमी / तास)	१६	१४	१४	१३	१३
वा-याचा वेग (किमी / तास)	२.४ - ४.६	वा-याची दिशा	पश्चिम	पश्चिम	पश्चिम	पश्चिम	पश्चिम

विशेष सूचना - या आठवड्यात परभणी जिल्ह्यात आकाश ढगाळ ते पूर्णता: ढगाळ जिल्ह्यात तुरळक ठिकाणी हलक्या स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे.

पिकांचे नाव	अवस्था	कृषि सल्ला
सोयाबीन	फुले लागणे	सोयाबीन पिकावर चक्रीभुंग्याचा प्रादुर्भाव दिसून येत आहे याच्या नियंत्रणासाठी ट्रायझोफॉस ४० टक्के २० मिली किंवा क्लोरॅनट्रानोलिप्रोल १८.५ टक्के ४ मिली प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
खरीप ज्वारी	वाढीची अवस्था	खरीप ज्वारी पिकावरील खोडकिडींच्या नियंत्रणासाठी कार्बारील ५० टक्के २० मिली प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
बाजरी	--	--
ऊस	वाढीची अवस्था	ऊस पिकावरील हुमणी किडींचा प्रादुर्भाव दिसून आल्यास याच्या नियंत्रणासाठी फिप्रोनील ४० टक्के ४ ग्रॅम प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून आळवणी करावी.
हळद	वाढीची अवस्था	हळद पिकावर कंदमाशीचा प्रादुर्भाव दिसून आल्यास क्लोरपायरीफॉस २५ टक्के ६०० मिली प्रती एकर याप्रमाणे पिकास आळवणी करावी.
संत्रा/ मोसंबी	फळ वाढीची अवस्था	संत्रा / मोसंबी बागेस पाण्याचा ताण बसत असल्यास ठिबक सिंचन पध्दतीने बागेस पाणी दयावे.
डाळिंब	फुलोरा अवस्था (मृगबहार)	पावासात पडलेल्या खंडामुळे मृगबहार धरलेल्या डाळिंब बागेत पाण्याचा ताण पडत असल्यास पाणी व्यवस्थापन करावे.
चिकू	वाढीची अवस्था	पावासात पडलेल्या खंडामुळे चिकूच्या बागेत पाण्याचा ताण पडत असल्यास पाणी व्यवस्थापन करावे.
फुलशेती	वाढीची अवस्था	गुलाब फुलपिकावर रसशोषण करणा-या किडींचा प्रादुर्भाव आढळून आल्यास याच्या नियंत्रणासाठी डायमिथोएट ३० टक्के १३ मिली प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
भाजीपाला	फळधारणा	मिरचीवरील रसशोषण करणा-या किडींच्या नियंत्रणासाठी फेनप्रोपॅथीन ३० टक्के ३.५ मिली किंवा फिप्रोनील ५ टक्के २० मिली प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. भाजीपाला पिकास पाण्याचा ताण बसत असल्यास पाणी व्यवस्थापन करावे.
चारा पिके	वाढीची अवस्था	खरीप हंगामात लागवड केलेल्या चारा पिकास पाणी व्यवस्थापन करावे.
कृषि अभियांत्रिकी	--	आंतरमशागतीची कामे उताराला आडवी (समतल रेषेत) करावी.

सदर कृषि सल्ला पत्रिका वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी येथील ग्रामीण कृषि मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ समितीच्या शिफारशीवरून तयार करून प्रसारित करण्यात आली.

मुख्य प्रकल्प समन्वयक
ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी



औरंगाबाद जिल्हा कृषि हवामान सल्ला पत्रक क्रमांक - ३८/२०१७

शुक्रवार दिनांक - ११.०८.२०१७

औरंगाबाद जिल्हयाकरीता दिनांक १२ ते १६ ऑगस्ट २०१७ साठी हवामान अंदाज

हवामान घटक	१२/०८	१३/०८	१४/०८	१५/०८	१६/०८
पाऊस (मिमी)	०५.०	०५.०	०४.०	०४.०	०६.०
कमाल तापमान (अं.से.)	३२.०	३१.०	३१.०	३०.०	२९.०
किमान तापमान (अं.से.)	२१.०	२१.०	२१.०	२१.०	२१.०
ढग स्थिती (आकाश)	पूर्णता: ढगाळ	पूर्णता: ढगाळ	पूर्णता: ढगाळ	पूर्णता: ढगाळ	ढगाळ
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%)	७५	७८	८०	८१	८३
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%)	५६	५६	५६	५७	५९
वा-याचा वेग (किमी / तास)	१९	१४	१०	१३	१३
वा-याची दिशा	पश्चिम	पश्चिम	पश्चिम	पश्चिम	पश्चिम

विशेष सुचना - या आठवड्यात औरंगाबाद जिल्ह्यात आकाश ढगाळ ते पूर्णता: ढगाळ जिल्ह्यात हलका ते मध्यम पावसाची शक्यता आहे.

पिकांचे नाव	अवस्था	कृषि सल्ला
सोयाबीन	फुले लागणे	सोयाबीन पिकावर चक्रीभुंग्याचा प्रादुर्भाव दिसून येत आहे याच्या नियंत्रणासाठी ट्रायझोफॉस ४० टक्के २० मिली किंवा क्लोरॅनट्रानोलिप्रोल १८.५ टक्के ४ मिली प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
खरीप ज्वारी	वाढीची अवस्था	खरीप ज्वारी पिकावरील खोडकिडीच्या नियंत्रणासाठी कार्बारील ५० टक्के २० मिली प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
बाजरी	--	--
ऊस	वाढीची अवस्था	ऊस पिकावरील हुमणी किडीचा प्रादुर्भाव दिसून आल्यास याच्या नियंत्रणासाठी फिप्रोनील ४० टक्के ४ ग्रॅम प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून आळवणी करावी.
हळद	वाढीची अवस्था	हळद पिकावर कंदमाशीचा प्रादुर्भाव दिसून आल्यास क्लोरपायरीफॉस २५ टक्के ६०० मिली प्रती एकर याप्रमाणे पिकास आळवणी करावी.
संत्रा/ मोसंबी	फळ वाढीची अवस्था	संत्रा / मोसंबी बागेस पाण्याचा ताण बसत असल्यास ठिबक सिंचन पध्दतीने बागेस पाणी द्यावे.
डाळिंब	फुलारा अवस्था (मृगबहार)	पावासात पडलेल्या खंडामुळे मृगबहार धरलेल्या डाळिंब बागेत पाण्याचा ताण पडत असल्यास पाणी व्यवस्थापन करावे.
चिकू	वाढीची अवस्था	पावासात पडलेल्या खंडामुळे चिकूच्या बागेत पाण्याचा ताण पडत असल्यास पाणी व्यवस्थापन करावे.
फुलशेती	वाढीची अवस्था	गुलाब फुलपिकावर रसशोषण करणा-या किडीचा प्रादुर्भाव आढळून आल्यास याच्या नियंत्रणासाठी डायमिथोएट ३० टक्के १३ मिली प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
भाजीपाला	फळधारणा	मिरचीवरील रसशोषण करणा-या किडीच्या नियंत्रणासाठी फेनप्रोपॅथीन ३० टक्के ३.५ मिली किंवा फिप्रोनील ५ टक्के २० मिली प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. भाजीपाला पिकास पाण्याचा ताण बसत असल्यास पाणी व्यवस्थापन करावे.
चारा पिके	वाढीची अवस्था	खरीप हंगामात लागवड केलेल्या चारा पिकास पाणी व्यवस्थापन करावे.
कृषि अभियांत्रिकी	--	आंतरमशागतीची कामे उताराला आडवी (समतल रेषेत) करावी.

सदर कृषि सल्ला पत्रिका वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी येथील ग्रामीण कृषि मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ समितीच्या शिफारशीवरून तयार करून प्रसारित करण्यात आली.

मुख्य प्रकल्प समन्वयक
ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी - ४३१ ४०२
ईमेल - gkmsparbhani@gmail.com



बीड जिल्हा कृषि हवामान सल्ला पत्रक क्रमांक - ३८/२०१७

शुक्रवार दिनांक - ११.०८.२०१७

बीड जिल्हयाकरीता दिनांक १२ ते १६ ऑगस्ट २०१७ साठी हवामान अंदाज

हवामान घटक	१२/०८	१३/०८	१४/०८	१५/०८	१६/०८
पाऊस (मिमी)	०३.०	००.०	०४.०	१३.०	१४.०
कमाल तापमान (अं.से.)	३४.०	३५.०	३५.०	३४.०	३४.०
किमान तापमान (अं.से.)	२१.०	२०.०	२०.०	२१.०	२०.०
ढग स्थिती (आकाश)	पूर्णता: ढगाळ	पूर्णता: ढगाळ	पूर्णता: ढगाळ	पूर्णता: ढगाळ	पूर्णता: ढगाळ
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%)	७५	७६	७२	८१	८२
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%)	५३	५०	४८	४९	६५
वा-याचा वेग (किमी / तास)	१९	१५	१६	१४	१४
वा-याची दिशा	पश्चिम	पश्चिम	पश्चिम	पश्चिम	पश्चिम

विशेष सूचना - या आठवड्यात बीड जिल्हयात आकाश ढगाळ ते पूर्णता: ढगाळ जिल्हयात हलका ते मध्यम पावसाची शक्यता आहे.

पिकांचे नाव	अवस्था	कृषि सल्ला
सोयाबीन	फुले लागणे	सोयाबीन पिकावर चक्रीभुंग्याचा प्रादुर्भाव दिसून येत आहे याच्या नियंत्रणासाठी ट्रायझोफॉस ४० टक्के २० मिली किंवा क्लोरॅनट्रानोलिप्रोल १८.५ टक्के ४ मिली प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
खरीप ज्वारी	वाढीची अवस्था	खरीप ज्वारी पिकावरील खोडकिडींच्या नियंत्रणासाठी कार्बारील ५० टक्के २० मिली प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
बाजरी	--	--
ऊस	वाढीची अवस्था	ऊस पिकावरील हुमणी किडींचा प्रादुर्भाव दिसून आल्यास याच्या नियंत्रणासाठी फिप्रोनील ४० टक्के ४ ग्रॅम प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून आळवणी करावी.
हळद	वाढीची अवस्था	हळद पिकावर कंदमाशीचा प्रादुर्भाव दिसून आल्यास क्लोरपायरीफॉस २५ टक्के ६०० मिली प्रती एकर याप्रमाणे पिकास आळवणी करावी.
संत्रा/ मोसंबी	फळ वाढीची अवस्था	संत्रा / मोसंबी बागेस पाण्याचा ताण बसत असल्यास ठिबक सिंचन पध्दतीने बागेस पाणी द्यावे.
डाळिंब	फुलोरा अवस्था (मृगबहार)	पावासात पडलेल्या खंडामुळे मृगबहार धरलेल्या डाळिंब बागेत पाण्याचा ताण पडत असल्यास पाणी व्यवस्थापन करावे.
चिकू	वाढीची अवस्था	पावासात पडलेल्या खंडामुळे चिकूच्या बागेत पाण्याचा ताण पडत असल्यास पाणी व्यवस्थापन करावे.
फुलशेती	वाढीची अवस्था	गुलाब फुलपिकावर रसशोषण करणा-या किडींचा प्रादुर्भाव आढळून आल्यास याच्या नियंत्रणासाठी डायमिथोएट ३० टक्के १३ मिली प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
भाजीपाला	फळधारणा	मिरचीवरील रसशोषण करणा-या किडींच्या नियंत्रणासाठी फेनप्रोपॅथीन ३० टक्के ३.५ मिली किंवा फिप्रोनील ५ टक्के २० मिली प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. भाजीपाला पिकास पाण्याचा ताण बसत असल्यास पाणी व्यवस्थापन करावे.
चारा पिके	वाढीची अवस्था	खरीप हंगामात लागवड केलेल्या चारा पिकास पाणी व्यवस्थापन करावे.
कृषि अभियांत्रिकी	--	आंतरमशागतीची कामे उताराला आडवी (समतल रेषेत) करावी.

सदर कृषि सल्ला पत्रिका वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी येथील ग्रामीण कृषि मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ समितीच्या शिफारशीवरून तयार करून प्रसारित करण्यात आली.

मुख्य प्रकल्प समन्वयक
ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी



हिंगोली जिल्हा कृषि हवामान सल्ला पत्रक क्रमांक - ३८/२०१७

शुक्रवार दिनांक - ११.०८.२०१७

हिंगोली जिल्ह्याकरीता दिनांक १२ ते १६ ऑगस्ट २०१७ साठी हवामान अंदाज

हवामान घटक	१२/०८	१३/०८	१४/०८	१५/०८	१६/०८
पाऊस (मिमी)	००.०	०१.०	००.०	१९.०	१४.०
कमाल तापमान (अं.से.)	३३.०	३२.०	३३.०	३२.०	३२.०
किमान तापमान (अं.से.)	२३.०	२२.०	२२.०	२२.०	२१.०
ढग स्थिती (आकाश)	पूर्णता: ढगाळ	पूर्णता: ढगाळ	पूर्णता: ढगाळ	पूर्णता: ढगाळ	पूर्णता: ढगाळ
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%)	७५	७७	७४	८८	८८
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%)	५६	५४	५१	५१	६७
वा-याचा वेग (किमी / तास)	१४	११	१२	१२	१४
वा-याची दिशा	पश्चिम	पश्चिम	पश्चिम	पश्चिम	पश्चिम

विशेष सुचना - या आठवड्यात हिंगोली जिल्ह्यात आकाश ढगाळ ते पूर्णता: ढगाळ जिल्ह्यात हलका ते मध्यम पावसाची शक्यता आहे.

पिकांचे नाव	अवस्था	कृषि सल्ला
सोयाबीन	फुले लागणे	सोयाबीन पिकावर चक्रीभुंग्याचा प्रादुर्भाव दिसून येत आहे याच्या नियंत्रणासाठी ट्रायझोफॉस ४० टक्के २० मिली किंवा क्लोरॉनट्रानोलिप्रोल १८.५ टक्के ४ मिली प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
खरीप ज्वारी	वाढीची अवस्था	खरीप ज्वारी पिकावरील खोडकिडींच्या नियंत्रणासाठी कार्बारील ५० टक्के २० मिली प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
बाजरी	--	--
ऊस	वाढीची अवस्था	ऊस पिकावरील हुमणी किडींचा प्रादुर्भाव दिसून आल्यास याच्या नियंत्रणासाठी फिप्रोनील ४० टक्के ४ ग्रॅम प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून आळवणी करावी.
हळद	वाढीची अवस्था	हळद पिकावर कंदमाशीचा प्रादुर्भाव दिसून आल्यास क्लोरपायरीफॉस २५ टक्के ६०० मिली प्रती एकर याप्रमाणे पिकास आळवणी करावी.
संत्रा/ मोसंबी	फळ वाढीची अवस्था	संत्रा / मोसंबी बागेस पाण्याचा ताण बसत असल्यास ठिबक सिंचन पध्दतीने बागेस पाणी द्यावे.
डाळिंब	फुलोरा अवस्था (मृगबहार)	पावासात पडलेल्या खंडामुळे मृगबहार धरलेल्या डाळिंब बागेत पाण्याचा ताण पडत असल्यास पाणी व्यवस्थापन करावे.
चिकू	वाढीची अवस्था	पावासात पडलेल्या खंडामुळे चिकूच्या बागेत पाण्याचा ताण पडत असल्यास पाणी व्यवस्थापन करावे.
फुलशेती	वाढीची अवस्था	गुलाब फुलपिकावर रसशोषण करणा-या किडींचा प्रादुर्भाव आढळून आल्यास याच्या नियंत्रणासाठी डायमिथोएट ३० टक्के १३ मिली प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
भाजीपाला	फळधारणा	मिरचीवरील रसशोषण करणा-या किडींच्या नियंत्रणासाठी फेनप्रोपॅथीन ३० टक्के ३.५ मिली किंवा फिप्रोनील ५ टक्के २० मिली प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. भाजीपाला पिकास पाण्याचा ताण बसत असल्यास पाणी व्यवस्थापन करावे.
चारा पिके	वाढीची अवस्था	खरीप हंगामात लागवड केलेल्या चारा पिकास पाणी व्यवस्थापन करावे.
कृषि अभियांत्रिकी	--	आंतरमशागतीची कामे उताराला आडवी (समतल रेषेत) करावी.

सदर कृषि सल्ला पत्रिका वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी येथील ग्रामीण कृषि मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ समितीच्या शिफारशीवरून तयार करून प्रसारित करण्यात आली.

मुख्य प्रकल्प समन्वयक
ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी



जालना जिल्हा कृषि हवामान सल्ला पत्रक क्रमांक - ३८/२०१७

शुक्रवार दिनांक - ११.०८.२०१७

जालना जिल्ह्याकरीता दिनांक १२ ते १६ ऑगस्ट २०१७ साठी हवामान अंदाज

हवामान घटक	१२/०८	१३/०८	१४/०८	१५/०८	१६/०८
पाऊस (मिमी)	००.०	००.०	०२.०	०३.०	०४.०
कमाल तापमान (अं.से.)	३४.०	३५.०	३५.०	३४.०	३४.०
किमान तापमान (अं.से.)	२२.०	२१.०	२१.०	२१.०	२१.०
ढग स्थिती (आकाश)	पूर्णता: ढगाळ	पूर्णता: ढगाळ	पूर्णता: ढगाळ	पूर्णता: ढगाळ	पूर्णता: ढगाळ
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%)	७५	७७	७८	८३	८६
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%)	५४	५३	५३	५३	६१
वा-याचा वेग (किमी / तास)	१६	१४	१२	१२	१३
वा-याची दिशा	पश्चिम	पश्चिम	पश्चिम	पश्चिम	पश्चिम

विशेष सूचना - या आठवड्यात जालना जिल्ह्यात आकाश ढगाळ ते पूर्णता: ढगाळ जिल्ह्यात तुरळक ठिकाणी हलक्या पावसाची शक्यता आहे.

पिकांचे नाव	अवस्था	कृषि सल्ला
सोयाबीन	फुले लागणे	सोयाबीन पिकावर चक्रीभुंग्याचा प्रादुर्भाव दिसून येत आहे याच्या नियंत्रणासाठी ट्रायझोफॉस ४० टक्के २० मिली किंवा क्लोरॉनट्रानोलिप्रोल १८.५ टक्के ४ मिली प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
खरीप ज्वारी	वाढीची अवस्था	खरीप ज्वारी पिकावरील खोडकिडीच्या नियंत्रणासाठी कार्बारील ५० टक्के २० मिली प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
बाजरी	--	--
ऊस	वाढीची अवस्था	ऊस पिकावरील हुमणी किडीचा प्रादुर्भाव दिसून आल्यास याच्या नियंत्रणासाठी फिप्रोनील ४० टक्के ४ ग्रॅम प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून आळवणी करावी.
हळद	वाढीची अवस्था	हळद पिकावर कंदमाशीचा प्रादुर्भाव दिसून आल्यास क्लोरपायरीफॉस २५ टक्के ६०० मिली प्रती एकर याप्रमाणे पिकास आळवणी करावी.
संत्रा/ मोसंबी	फळ वाढीची अवस्था	संत्रा / मोसंबी बागेस पाण्याचा ताण बसत असल्यास ठिबक सिंचन पध्दतीने बागेस पाणी द्यावे.
डाळिंब	फुलोरा अवस्था (मृगबहार)	पावासात पडलेल्या खंडामुळे मृगबहार धरलेल्या डाळिंब बागेत पाण्याचा ताण पडत असल्यास पाणी व्यवस्थापन करावे.
चिकू	वाढीची अवस्था	पावासात पडलेल्या खंडामुळे चिकूच्या बागेत पाण्याचा ताण पडत असल्यास पाणी व्यवस्थापन करावे.
फुलशेती	वाढीची अवस्था	गुलाब फुलपिकावर रसशोषण करणा-या किडीचा प्रादुर्भाव आढळून आल्यास याच्या नियंत्रणासाठी डायमिथोएट ३० टक्के १३ मिली प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
भाजीपाला	फळधारणा	मिरचीवरील रसशोषण करणा-या किडीच्या नियंत्रणासाठी फेनप्रोपॅथीन ३० टक्के ३.५ मिली किंवा फिप्रोनील ५ टक्के २० मिली प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. भाजीपाला पिकास पाण्याचा ताण बसत असल्यास पाणी व्यवस्थापन करावे.
चारा पिके	वाढीची अवस्था	खरीप हंगामात लागवड केलेल्या चारा पिकास पाणी व्यवस्थापन करावे.
कृषि अभियांत्रिकी	--	आंतरमशागतीची कामे उताराला आडवी (समतल रेषेत) करावी.

सदर कृषि सल्ला पत्रिका वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी येथील ग्रामीण कृषि मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ समितीच्या शिफारशीवरून तयार करून प्रसारित करण्यात आली.

मुख्य प्रकल्प समन्वयक
ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी



लातूर जिल्हा कृषि हवामान सल्ला पत्रक क्रमांक - ३८/२०१७

शुक्रवार दिनांक - ११.०८.२०१७

लातूर जिल्हयाकरीता दिनांक १२ ते १६ ऑगस्ट २०१७ साठी हवामान अंदाज

हवामान घटक	१२/०८	१३/०८	१४/०८	१५/०८	१६/०८
पाऊस (मिमी)	००.०	००.०	०१.०	०३.०	०७.०
कमाल तापमान (अं.से.)	३०.०	३०.०	३१.०	३०.०	३१.०
किमान तापमान (अं.से.)	२१.०	२०.०	२०.०	२१.०	२०.०
ढग स्थिती (आकाश)	पूर्णता: ढगाळ	पूर्णता: ढगाळ	पूर्णता: ढगाळ	पूर्णता: ढगाळ	पूर्णता: ढगाळ
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%)	७८	७६	७४	८१	८५
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%)	५६	५१	४३	४८	६३
वा-याचा वेग (किमी / तास)	१६	१४	१२	११	१६
वा-याची दिशा	पश्चिम	पश्चिम	पश्चिम	वायव्य	पश्चिम

विशेष सुचना - या आठवड्यात लातूर जिल्हयात आकाश ढगाळ ते पूर्णता: ढगाळ जिल्हयात तुरळक ठिकाणी हलक्या पावसाची शक्यता आहे.

पिकांचे नाव	अवस्था	कृषि सल्ला
सोयाबीन	फुले लागणे	सोयाबीन पिकावर चक्रीभुंग्याचा प्रादुर्भाव दिसून येत आहे याच्या नियंत्रणासाठी ट्रायझोफॉस ४० टक्के २० मिली किंवा क्लोरॉनट्रानोलिप्रोल १८.५ टक्के ४ मिली प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
खरीप ज्वारी	वाढीची अवस्था	खरीप ज्वारी पिकावरील खोडकिडींच्या नियंत्रणासाठी कार्बारील ५० टक्के २० मिली प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
बाजरी	--	--
ऊस	वाढीची अवस्था	ऊस पिकावरील हुमणी किडींचा प्रादुर्भाव दिसून आल्यास याच्या नियंत्रणासाठी फिप्रोनील ४० टक्के ४ ग्रॅम प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून आळवणी करावी.
हळद	वाढीची अवस्था	हळद पिकावर कंदमाशीचा प्रादुर्भाव दिसून आल्यास क्लोरपायरीफॉस २५ टक्के ६०० मिली प्रती एकर याप्रमाणे पिकास आळवणी करावी.
संत्रा/ मोसंबी	फळ वाढीची अवस्था	संत्रा / मोसंबी बागेस पाण्याचा ताण बसत असल्यास ठिबक सिंचन पध्दतीने बागेस पाणी द्यावे.
डाळिंब	फुलारा अवस्था (मृगबहार)	पावासात पडलेल्या खंडामुळे मृगबहार धरलेल्या डाळिंब बागेत पाण्याचा ताण पडत असल्यास पाणी व्यवस्थापन करावे.
चिकू	वाढीची अवस्था	पावासात पडलेल्या खंडामुळे चिकूच्या बागेत पाण्याचा ताण पडत असल्यास पाणी व्यवस्थापन करावे.
फुलशेती	वाढीची अवस्था	गुलाब फुलपिकावर रसशोषण करणा-या किडींचा प्रादुर्भाव आढळून आल्यास याच्या नियंत्रणासाठी डायमिथोएट ३० टक्के १३ मिली प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
भाजीपाला	फळधारणा	मिरचीवरील रसशोषण करणा-या किडींच्या नियंत्रणासाठी फेनप्रोपॅथीन ३० टक्के ३.५ मिली किंवा फिप्रोनील ५ टक्के २० मिली प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. भाजीपाला पिकास पाण्याचा ताण बसत असल्यास पाणी व्यवस्थापन करावे.
चारा पिके	वाढीची अवस्था	खरीप हंगामात लागवड केलेल्या चारा पिकास पाणी व्यवस्थापन करावे.
कृषि अभियांत्रिकी	--	आंतरमशागतीची कामे उताराला आडवी (समतल रेषेत) करावी.

सदर कृषि सल्ला पत्रिका वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी येथील ग्रामीण कृषि मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ समितीच्या शिफारशीवरून तयार करून प्रसारित करण्यात आली.

मुख्य प्रकल्प समन्वयक
ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी



नांदेड जिल्हा कृषि हवामान सल्ला पत्रक क्रमांक - ३८/२०१७

शुक्रवार दिनांक - ११.०८.२०१७

नांदेड जिल्हयाकरीता दिनांक १२ ते १६ ऑगस्ट २०१७ साठी हवामान अंदाज

हवामान घटक	१२/०८	१३/०८	१४/०८	१५/०८	१६/०८
पाऊस (मिमी)	००.०	०१.०	००.०	०९.०	१५.०
कमाल तापमान (अं.से.)	३२.०	३२.०	३३.०	३२.०	३३.०
किमान तापमान (अं.से.)	२२.०	२२.०	२२.०	२१.०	२१.०
ढग स्थिती (आकाश)	पूर्णता: ढगाळ	पूर्णता: ढगाळ	पूर्णता: ढगाळ	पूर्णता: ढगाळ	पूर्णता: ढगाळ
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%)	७४	७४	७३	८७	८८
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%)	५५	५२	४७	४९	६८
वा-याचा वेग (किमी / तास)	१६	१२	१०	११	१५
वा-याची दिशा	पश्चिम	पश्चिम	पश्चिम	वायव्य	पश्चिम

विशेष या आठवड्यात नांदेड जिल्हयात आकाश ढगाळ ते पूर्णता: ढगाळ जिल्हयात तुरळक ठिकाणी हलक्या ते सुचना - मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे.

पिकांचे नाव	अवस्था	कृषि सल्ला
सोयाबीन	फुले लागणे	सोयाबीन पिकावर चक्रीभुंग्याचा प्रादुर्भाव दिसून येत आहे याच्या नियंत्रणासाठी ट्रायझोफॉस ४० टक्के २० मिली किंवा क्लोरॉनट्रानोलिप्रोल १८.५ टक्के ४ मिली प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
खरीप ज्वारी	वाढीची अवस्था	खरीप ज्वारी पिकावरील खोडकिडींच्या नियंत्रणासाठी कार्बारील ५० टक्के २० मिली प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
बाजरी	--	--
ऊस	वाढीची अवस्था	ऊस पिकावरील हुमणी किडींचा प्रादुर्भाव दिसून आल्यास याच्या नियंत्रणासाठी फिप्रोनील ४० टक्के ४ ग्रॅम प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून आळवणी करावी.
हळद	वाढीची अवस्था	हळद पिकावर कंदमाशीचा प्रादुर्भाव दिसून आल्यास क्लोरपायरीफॉस २५ टक्के ६०० मिली प्रती एकर याप्रमाणे पिकास आळवणी करावी.
संत्रा/ मोसंबी	फळ वाढीची अवस्था	संत्रा / मोसंबी बागेस पाण्याचा ताण बसत असल्यास ठिबक सिंचन पध्दतीने बागेस पाणी द्यावे.
डाळिंब	फुलारा अवस्था (मृगबहार)	पावासात पडलेल्या खंडामुळे मृगबहार धरलेल्या डाळिंब बागेत पाण्याचा ताण पडत असल्यास पाणी व्यवस्थापन करावे.
चिकू	वाढीची अवस्था	पावासात पडलेल्या खंडामुळे चिकूच्या बागेत पाण्याचा ताण पडत असल्यास पाणी व्यवस्थापन करावे.
फुलशेती	वाढीची अवस्था	गुलाब फुलपिकावर रसशोषण करणा-या किडींचा प्रादुर्भाव आढळून आल्यास याच्या नियंत्रणासाठी डायमिथोएट ३० टक्के १३ मिली प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
भाजीपाला	फळधारणा	मिरचीवरील रसशोषण करणा-या किडींच्या नियंत्रणासाठी फेनप्रोपॅथीन ३० टक्के ३.५ मिली किंवा फिप्रोनील ५ टक्के २० मिली प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. भाजीपाला पिकास पाण्याचा ताण बसत असल्यास पाणी व्यवस्थापन करावे.
चारा पिके	वाढीची अवस्था	खरीप हंगामात लागवड केलेल्या चारा पिकास पाणी व्यवस्थापन करावे.
कृषि अभियांत्रिकी	--	आंतरमशागतीची कामे उताराला आडवी (समतल रेषेत) करावी.

सदर कृषि सल्ला पत्रिका वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी येथील ग्रामीण कृषि मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ समितीच्या शिफारशीवरून तयार करून प्रसारित करण्यात आली.

मुख्य प्रकल्प समन्वयक
ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी



उस्मानाबाद जिल्हा कृषि हवामान सल्ला पत्रक क्रमांक - ३८/२०१७

शुक्रवार दिनांक - ११.०८.२०१७

उस्मानाबाद जिल्हयाकरीता दिनांक १२ ते १६ ऑगस्ट २०१७ साठी हवामान अंदाज

हवामान घटक	१२/०८	१३/०८	१४/०८	१५/०८	१६/०८
पाऊस (मिमी)	००.०	००.०	०२.०	०३.०	०५.०
कमाल तापमान (अं.से.)	३१.०	३१.०	३२.०	३१.०	२८.०
किमान तापमान (अं.से.)	२१.०	२०.०	२०.०	२१.०	२०.०
ढग स्थिती (आकाश)	पूर्णता: ढगाळ	पूर्णता: ढगाळ	पूर्णता: ढगाळ	पूर्णता: ढगाळ	पूर्णता: ढगाळ
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%)	७७	७७	७४	७६	८१
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%)	५४	४९	४३	४६	५९
वा-याचा वेग (किमी / तास)	१६	१५	१४	१५	१६
वा-याची दिशा	पश्चिम	पश्चिम	पश्चिम	वायव्य	पश्चिम

विशेष सुचना - या आठवडयात उस्मानाबाद जिल्हयात आकाश ढगाळ ते पूर्णता: ढगाळ जिल्हयात तुरळक ठिकाणी हलक्या स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे.

पिकांचे नाव	अवस्था	कृषि सल्ला
सोयाबीन	फुले लागणे	सोयाबीन पिकावर चक्रीभुंग्याचा प्रादुर्भाव दिसून येत आहे याच्या नियंत्रणासाठी ट्रायझोफॉस ४० टक्के २० मिली किंवा क्लोरॅनट्रानोलिप्रोल १८.५ टक्के ४ मिली प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
खरीप ज्वारी	वाढीची अवस्था	खरीप ज्वारी पिकावरील खोडकिडींच्या नियंत्रणासाठी कार्बारील ५० टक्के २० मिली प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
बाजरी	--	--
ऊस	वाढीची अवस्था	ऊस पिकावरील हुमणी किडींचा प्रादुर्भाव दिसून आल्यास याच्या नियंत्रणासाठी फिप्रोनील ४० टक्के ४ ग्रॅम प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून आळवणी करावी.
हळद	वाढीची अवस्था	हळद पिकावर कंदमाशीचा प्रादुर्भाव दिसून आल्यास क्लोरपायरीफॉस २५ टक्के ६०० मिली प्रती एकर याप्रमाणे पिकास आळवणी करावी.
संत्रा/ मोसंबी	फळ वाढीची अवस्था	संत्रा / मोसंबी बागेस पाण्याचा ताण बसत असल्यास ठिबक सिंचन पध्दतीने बागेस पाणी द्यावे.
डाळिंब	फुलारा अवस्था (मृगबहार)	पावासात पडलेल्या खंडामुळे मृगबहार धरलेल्या डाळिंब बागेत पाण्याचा ताण पडत असल्यास पाणी व्यवस्थापन करावे.
चिकू	वाढीची अवस्था	पावासात पडलेल्या खंडामुळे चिकूच्या बागेत पाण्याचा ताण पडत असल्यास पाणी व्यवस्थापन करावे.
फुलशेती	वाढीची अवस्था	गुलाब फुलपिकावर रसशोषण करणा-या किडींचा प्रादुर्भाव आढळून आल्यास याच्या नियंत्रणासाठी डायमिथोएट ३० टक्के १३ मिली प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
भाजीपाला	फळधारणा	मिरचीवरील रसशोषण करणा-या किडींच्या नियंत्रणासाठी फेनप्रोपॅथीन ३० टक्के ३.५ मिली किंवा फिप्रोनील ५ टक्के २० मिली प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. भाजीपाला पिकास पाण्याचा ताण बसत असल्यास पाणी व्यवस्थापन करावे.
चारा पिके	वाढीची अवस्था	खरीप हंगामात लागवड केलेल्या चारा पिकास पाणी व्यवस्थापन करावे.
कृषि अभियांत्रिकी	--	आंतरमशागतीची कामे उताराला आडवी (समतल रेषेत) करावी.

सदर कृषि सल्ला पत्रिका वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी येथील ग्रामीण कृषि मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ समितीच्या शिफारशीवरून तयार करून प्रसारित करण्यात आली.

मुख्य प्रकल्प समन्वयक
ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी



सल्ला पत्रक क्रमांक - ३८/२०१७

शुक्रवार दिनांक - ११.०८.२०१७

मराठवाडयाकरीता चालु आठवडयातील हवामान अंदाज (दिनांक १२ ते १६ ऑगस्ट २०१७)

हवामान घटक	जिल्हयाचे नांव							
	औरंगाबाद	बीड	हिंगोली	जालना	लातूर	नांदेड	उस्मानाबाद	परभणी
पाऊस (मिमी)	२४.०	३४.०	३४.०	०९.०	११.०	२५.०	१०.०	१६.०
कमाल तापमान (अं.से.)	२९.०-३२.०	३४.०-३५.०	३२.०-३३.०	३४.०-३५.०	३०.०-३१.०	३२.०-३३.०	२८.०-३२.०	३२.०-३३.०
किमान तापमान(अं.से.)	२१.०	२०.०-२१.०	२१.०-२३.०	२१.०-२२.०	२०.०-२१.०	२१.०-२२.०	२०.०-२१.०	२२.०-२३.०
ढग स्थिती (आकाश)	ढगाळ ते पूर्णता: ढगाळ	पूर्णता: ढगाळ	पूर्णता: ढगाळ	पूर्णता: ढगाळ	पूर्णता: ढगाळ	पूर्णता: ढगाळ	पूर्णता: ढगाळ	पूर्णता: ढगाळ
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%)	७५ - ८३	७२ - ८२	७४ - ८८	७५ - ८६	७४ - ८५	७३ - ८८	७४ - ८१	७४ - ८६
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%)	५६ - ५९	४८ - ६५	५१ - ६७	५३ - ६१	४३ - ६३	४७ - ६८	४३ - ५९	५० - ६५
वा-याचा वेग (किमी/तास)	१० - १९	१४ - १९	११ - १४	१२ - १६	११ - १६	१० - १६	१४ - १६	१३ - १६
वा-याची दिशा	पश्चिम	पश्चिम	पश्चिम	पश्चिम	पश्चिम ते वायव्य	पश्चिम ते वायव्य	पश्चिम ते वायव्य	पश्चिम

विशेष सूचना या आठवडयात मराठवाडयात आकाश ढगाळ ते पूर्णता: ढगाळ राहून औरंगाबाद, बीड, हिंगोली व नांदेड जिल्हयात हलका ते मध्यम तर इतर जिल्हयात तुरळक ठिकाणी हलक्या पावसाची शक्यता आहे.

पिकांचे नाव	अवस्था	कृषि सल्ला
सोयाबीन	फुले लागणे	सोयाबीन पिकावर चक्रीभुंग्याचा प्रादुर्भाव दिसून येत आहे याच्या नियंत्रणासाठी ट्रायझोफॉस ४० टक्के २० मिली किंवा क्लोरॅनट्रानोलिप्रोल १८.५ टक्के ४ मिली प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
खरीप ज्वारी	वाढीची अवस्था	खरीप ज्वारी पिकावरील खोडकिडींच्या नियंत्रणासाठी कार्बारील ५० टक्के २० मिली प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
बाजरी	--	--
ऊस	वाढीची अवस्था	ऊस पिकावरील हुमणी किडींचा प्रादुर्भाव दिसून आल्यास याच्या नियंत्रणासाठी फिप्रोनील ४० टक्के ४ ग्रॅम प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून आळवणी करावी.
हळद	वाढीची अवस्था	हळद पिकावर कंदमाशीचा प्रादुर्भाव दिसून आल्यास क्लोरपायरीफॉस २५ टक्के ६०० मिली प्रती एकर याप्रमाणे पिकास आळवणी करावी.
संत्रा/ मोसंबी	फळ वाढीची अवस्था	संत्रा / मोसंबी बागेस पाण्याचा ताण बसत असल्यास ठिबक सिंचन पध्दतीने बागेस पाणी द्यावे.
डाळिंब	फुलोरा अवस्था (मृगबहार)	पावासात पडलेल्या खंडामुळे मृगबहार धरलेल्या डाळिंब बागेत पाण्याचा ताण पडत असल्यास पाणी व्यवस्थापन करावे.
चिकू	वाढीची अवस्था	पावासात पडलेल्या खंडामुळे चिकूच्या बागेत पाण्याचा ताण पडत असल्यास पाणी व्यवस्थापन करावे.
फुलशेती	वाढीची अवस्था	गुलाब फुलपिकावर रसशोषण करणा-या किडींचा प्रादुर्भाव आढळून आल्यास याच्या नियंत्रणासाठी डायमिथोएट ३० टक्के १३ मिली प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
भाजीपाला	फळधारणा	मिरचीवरील रसशोषण करणा-या किडींच्या नियंत्रणासाठी फेनप्रोपॅथ्रीन ३० टक्के ३.५ मिली किंवा फिप्रोनील ५ टक्के २० मिली प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. भाजीपाला पिकास पाण्याचा ताण बसत असल्यास पाणी व्यवस्थापन करावे.
चारा पिके	वाढीची अवस्था	खरीप हंगामात लागवड केलेल्या चारा पिकास पाणी व्यवस्थापन करावे.
कृषि अभियांत्रिकी	--	आंतरमशागतीची कामे उताराला आडवी (समतल रेषेत) करावी.

सदर कृषि सल्ला पत्रिका वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी येथील ग्रामीण कृषि मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ समितीच्या शिफारशीवरून तयार करून प्रसारित करण्यात आली.

मुख्य प्रकल्प समन्वयक
ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी